# AVERTISSEMENTS AGR. COLFS DLP 20-3-65 881441

BULLETIN TECHNIQUE STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL 15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde) C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 54 de Mars 1965

I965**-**5

AVERTISSEMENTS

#### I - ARBRES FRUITIERS -

Tavelure du Poirier : L'évolution de la végétation lente d'abord. s'accélère depuis quelques jours. Plusieurs variétés de Poiriers ont bien débourré.

Pour éviter des contaminations par les Ascospores ( le nombre des Périthèces mûrs devenant important) il serait utile d'appliquer un traitement, de préférence avec un produit Cuprique, sur toutes les variétés qui présentent des bourgeons bien ouverts.

## INFORMATIONS

Anthonome du Pommier : Dans les vergers atteints l'an dernier. un traitement insecticide sur les variétés qui auront atteint le stade dit "Bourgeon blanc" préviendra les attaques de l'Anthonome.

Cloque du Prunier: (Maladie des Pochettes) Nous rappelons que la déformation des jeunes fruits pourra être évitée par un traitement avec une spécialité Organo-cuprique ou Organique employée entre le débourrement et le stade du Bouton blanc.

Maladie criblée - Monilia - Gnomonia du cerisier : Utiliser un produit Cuprique ou une Bouillie Sulfocalcique, avant la floraison, puis après la chute des pétales.

### II - COLZA -

Charançons des tiges : Le temps doux de ces derniers jours a favorisé la sortie des insectes qui attaquent les Colza au début du développement des tiges.

En conséquence, un traitement devrait être envisagé dans les champs où les plants ont atteint le stade indiqué ci-dessus. Pour les autres, attendre l'apparition de ce même stade.

#### III - PRODUITS PESTICIDES -

Nous demandons à nos abonnés de bien vouloir noter une rectification à apporter à la liste des produits pesticides homologués en 1965 :

> Doryphore de la Pomme de terre : Poudrage : CARBARYL au lieu de IOO grM.A./Ha. il faut lire . . . . . . I.000 grM.A./Ha,

> > Bordeaux, le 18 Mars 1965 L'Inspecteur de la Protection des Végétaux J. BRUNETEAU

C. ROUSSEL Imprimerie de la Station de Bordeaux Directeur-Gérant: L. BOUYX

Le Contrôleur chargé des Avertissements

P157